

BiOWiSH™ Giải Pháp Cho Bệnh Thủy Sản

Trại Giống Và Ao Nuôi Thương Phẩm

Trong trại giống và ao nuôi thương phẩm, sự kết hợp của BiOWiSH™ AquaFarm và BiOWiSH™ MultiBio 3PS cung cấp những cải tiến sản xuất trong hệ thống có chất lượng nước kém và chịu áp lực về bệnh như Vibrio. Việc sử dụng kết hợp BiOWiSH™ AquaFarm và BiOWiSH™ MultiBio 3PS cải thiện khả năng sống sót và chất lượng sản xuất trong điều kiện bất lợi.

Liều Lượng Sử Dụng Cho Trại Giống Và Ao Nuôi Thương Phẩm

- Hàng ngày: Sử dụng lượng BiOWiSH™ theo khuyến cáo cho 1000 lít nước ao nuôi.
- Tăng liều lượng dần dần tỷ lệ với độ tăng tổng sinh khối trong ao nuôi.

Giai đoạn	Ấu trùng Zoa 1 đến ấu trùng Zoa 3	Ấu trùng Mysis 1 đến ấu trùng Mysis 3	Hậu ấu trùng 1 đến hậu ấu trùng 6	Hậu ấu trùng 7 đến hậu ấu trùng 12	Tải trọng hữu cơ cao
BiOWiSH™ AquaFarm (grams/ton of water/day)	0.5 g	0.5 to 1.0 g	1.0 to 1.5 g	1.5 to 2.0 g	2.0 to 5.0 g
BiOWiSH™ MultiBio 3PS (grams/ton of water/day)	0.25 to 0.5 g	0.5 to 1.0 g	1.0 to 1.5 g	1.5 to 2.0 g	2.0 to 5.0 g

- Hòa tan lượng sản phẩm BiOWiSH™ bằng dụng cụ sạch. Sau khi hòa tan, đổ đều dung dịch đã pha lên bề mặt nước ao nuôi

Trại Giống, Hệ Thống Raceway, Và Ao Nuôi Thương Phẩm

Sự kết hợp BiOWiSH™ AquaFarm Water Treatment and BiOWiSH™ MultiBio 3PS Direct Fed Microbial được khuyến cáo bởi Ứng Dụng Thực Tế Quản Lý Tốt Nhất (BMP) để cải thiện sức tăng trưởng và tỷ lệ sống trong trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm.


Liều lượng sử dụng - Áp dụng cho nước trong trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm (BiOWiSH™ AquaFarm)

- Hàng tuần: Sử dụng 1000g (1kg) BiOWiSH™ AquaFarm cho 1 ha.
- Hòa tan lượng BiOWiSH™ AquaFarm nước ao nuôi, dung ít nhất 20 lít nước cho 1000g BiOWiSH™. Sử dụng càng nhiều nước càng tốt.
- Áp dụng BiOWiSH™ AquaFarm với hệ thống dòng chảy hoặc hòa tan vào mép ao nuôi đối với lượng sản phẩm đầu. Liều lượng tiếp theo có thể được pha vào hệ thống dẫn nước trong khi làm đầy ao nuôi.

- BiOWiSH™ AquaFarm nên được sử dụng trong vòng 2 giờ sau khi mặt trời mọc.
- Đối với các ao nuôi chưa có bước chuẩn bị theo khuyến cáo của BiOWiSH, việc quan trọng là đánh giá mức độ của các chất hữu cơ ở đáy ao. Nếu tải trọng hữu cơ cao, khuyến cáo sử dụng 50% liều lượng trong tháng đầu tiên miễn là có đủ sự thông khí để tránh việc thiếu ôxi.
- Việc sử dụng BiOWiSH™ AquaFarm ngay từ ban đầu với việc chuẩn bị ao đầy đủ trước khi tiến hành thả giống rất được khuyến cáo để tránh dư thừa chất dinh dưỡng trong suốt thời gian sản xuất. Xin vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH trong chuẩn bị ao nuôi hoặc tham khảo ý kiến nhà phân phối BiOWiSH của bạn.

Liều lượng sử dụng – Áp dụng cho nước trong trại giống, hệ thống raceway và ao nuôi thương phẩm (BiOWiSH™ 3PS Direct Fed Microbial)

- Thêm 1000g BiOWiSH™ MultiBio 3PS (35.3 oz.) vào 1 tấn thức ăn.
- Giữ nguyên tỷ lệ khuyến cáo bằng việc thêm BiOWiSH™ MultiBio 3PS với mỗi lần thêm thức ăn.
- BiOWiSH™ MultiBio 3PS có thể được phủ lên thức ăn bằng việc sử dụng các chất lỏng đã được kiểm định.
- Đối với trang trại hoặc nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, để biết thêm thông tin về các hướng dẫn trộn thức ăn và sơ đồ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng BiOWiSH™ MultiBio 3PS thích hợp: Thức ăn nuôi trồng thủy sản nổi (Aquaculture Floating Feeds) hoặc thức ăn nuôi trồng thủy sản chìm (Aquaculture Sinking Feeds).



Liên hệ

BiOWiSH Technologies

Tel: +1 312 572 6700

Email: aquaculture@biowishtech.com

Web: biowishtech.com

Các ứng dụng sản phẩm quy định Hướng Dẫn Sử Dụng này dành cho các quốc gia được cho phép.

Biological help for the human race



www.biowishtech.com

BiOWiSH™ is a registered trademark of BiOWiSH Technologies, Inc.

Version 7

Biological Help for the Human Race™